

Impfkalender für Kinder und Jugendliche

Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO)

www.hausarzt-guenzburg.de

Lebensalter	Impfung gegen	Personenkreis Impfstoff®
ab 3. Lebensmonat	<i>Diphtherie</i> <i>Pertussis</i> (Keuchhusten) <i>Tetanus</i> (Wundstarrkrampf) <i>Hämophilus influenzae Typ b Hib</i> <i>Poliomyelitis</i> (Kinderlähmung) IPV <i>Hepatitis B HepB</i> 3x im Abstand von 4 Wochen als Hib-DPT-IPV-HepB -Kombinationsimpfung zusammen mit <i>Pneumokokken</i>	alle Säuglinge und Kleinkinder Infanrix Hexa® Prevenar®
2. Lebensjahr	<i>Diphtherie-Pertussis-Tetanus-Hib-IPV-HepB</i> 4. Injektion (Abschluss der Grundimmunisierung) als Hib-DPT-IPV-HepB -Kombinationsimpfung zusammen mit <i>Pneumokokken</i> <i>Masern-Mumps-Röteln</i> (Kombinationsimpfstoff MMR) 2. Injektion nach 4 Wochen empfohlen <i>Varicellen</i> (subcutan !) evtl. zusammen mit 1. MMR <i>Meningokokken C</i> (evtl. zusammen mit 2. MMR)	alle Kleinkinder und Kinder Infanrix Hexa® Prevenar® alle Kleinkinder und Kinder Priorix® (ab 15. Lebensmonat) Varivax® (11.-14. Lebensmonat) Menjugate®
ab 6. Lebensjahr	<i>Tetanus-Diphtherie-Pertussis</i> (Auffrischimpfung) <i>Nachhol-Impfungen</i> / Grundimmunisierung (bisher versäumte Impfungen außer gegen <i>Haemophilus influenzae</i>)	alle Kinder Boostrix® alle Kinder (und Erwachsene) z.B. Tet.-Diph.-Pert. + Polio Infanrix® + IPV® z.B. Tet.-Diph. + Polio Td pur® + IPV®
ab 10. Lebensjahr	<i>Diphtherie-Pertussis-Tetanus-Polio</i> (Auffrischimpfung, als DPT-IPV -Kombinationsimpfung)	alle Kinder Repevax®
9.-17. Lebensjahr	<i>Hepatitis B</i> (evtl. einmalige Auffrischimpfung bzw. Grundimmunisierung - Impfschema 0,1,6) <i>Tetanus</i> (Auffrischimpfung) <i>Diphtherie</i> (Auffrischimpfung) <i>Poliomyelitis</i> (Auffrischimpfung) <i>Pertussis</i> (Auffrischimpfung)	alle Kinder und Jugendliche Engerix K® (bis 16. LJ) Engerix E® (ab 16. LJ) alle Kinder und Jugendliche alle Kinder und Jugendliche alle Kinder und Jugendliche alle Kinder und Jugendliche
ab 13. Lebensjahr	<i>Varicellen</i> (2 Impfungen s.c. im Abstand von 4-8 Wochen)	Varivax®

grundsätzlich gilt: DPT-Auffrischimpfungen frühestens 5 Jahre nach Grundimmunisierung
Mindestabstand zwischen 1. und 2. Impfung 4 Wochen
Mindestabstand zwischen 2. und 3. Impfung 6 Monate